

סמסטר א', מועד ב', תשע"א, 11.3.2011

**בחינה ב"מבוא להסתברות" (המרצה: דר' רון פלד)**

משך הבחינה שלוש שעות.

ਮותר להשתמש בדף סיכום כתוב (דו-צדדי) ובמחשבון.

השאלון מורכב מ- 20 שאלות. כל תשובה נכונה מזוכה ב- +6 נקודות וכל תשובה לא נכונה מזוכה ב- -2 נקודות. מותר לסמן יותר מתשובה אחת לשאלת אם צברת S נקודות, ציון  $\max(\min(S, 100), 0)$ .

יש לרשום את התשובות הסופיות לשאלות בטבלאות הבאות (מחברת הבחינה ושאר הדפים בטופס המבחן משמשים לטיווח בלבד ולא ייבדקו).

**בהצלחה!!!**

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						

	7	8	9	10	11	12	13
A							
B							
C							
D							

	14	15	16	17	18
A					
B					
C					
D					

	19	20
A		
B		
C		
D		

## סוגיה ראשונה

לدني יש 16 מטבעות ממושפרים מ-1 עד 16. המספר של כל מטבע רשום עליו בצדיו האחד ובצדיו השני של כל מטבע רשומה האות "X" (ומספר המטבע אינו מופיע). דני מסדר את המטבעות על השולחן בשורה בסדר עולה, כאשר כל המושפרים גלוים לעין. בשלב "1", דני הופך כל מטבע בסיסי חצי באופן בלתי תלוי בין המטבעות. יהי  $Z_1$  מספר ה"X"ים הנגילים לעין לאחר שלב זה. בשלב "2", שוב הופך דני כל מטבע בסיסי חצי באופן בלתי תלוי בין המטבעות ובשלב הקודם. יהי  $Z_2$  מספר ה"X"ים הנגילים לעין לאחר שלב זה. באותו אופן מוגדרים שלב  $Z = Z_1 + Z_2$  לכל  $1, 2, \dots, 100$ . כלומר, בשלב  $Z$  דני הופך כל מטבע בסיסי חצי באופן בלתי תלוי בין המטבעות ובשלבים הקודמים.  $Z$  הוא מספר ה"X"ים הנגילים לעין לאחר שלב  $Z$ .

1. מהי תוחלת סכום המושפרים מיד לאחר שלב "1"?

- א. 34
- ב. 68
- ג. 136
- ד. 272

2. מהי שונות כמות הפעמים שדני רואה את הספרה "1" מיד לאחר שלב "1"? (שים לב, למשל, כי על המטבע עם המספר 10 מופיעות הספרות "1" ו-"0". לדוגמה, אם דני רואה רק את המטבעות עם המושפרים 1, 4, 11, 15 אז מספר הפעמים שהוא רואה את הספרה "1" הוא 4).

- א. 9/2
- ב. 8/4
- ג. 9/4
- ד. 11/4

3. מהי תוחלת סכום המושפרים מיד לאחר שלב "2"?

- א. 34
- ב. 68
- ג. 136
- ד. 272

.4. חשב את הסיכוי ש  $Y_5 = 7$

.א.  $1 - 2^{-5}$

.ב.  $\frac{\binom{8}{7} \binom{8}{1}}{\binom{16}{8}}$

.ג.  $e^{-2} \frac{2^7}{7!}$

.ד.  $\binom{16}{7} 2^{-16}$

.5. מקדם המתאים  $\rho(Y_5, Y_6)$  מקיים

.א.  $-1 \leq \rho(Y_5, Y_6) < 0$

.ב.  $\rho(Y_5, Y_6) = 0$

.ג.  $0 < \rho(Y_5, Y_6) < 1$

.ד.  $\rho(Y_5, Y_6) = 1$

.6. חשבו בקירוב את ההסתברות  $P\left(7.8 \leq \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} Y_i \leq 8.1\right)$

.א.  $\phi(0.5) - \phi(-1)$

.ב.  $\phi(1) - \frac{1}{2}$

.ג.  $\phi(2) - \phi(-1)$

.ד.  $e^{-800} \frac{800^{810}}{810!} - e^{-800} \frac{800^{780}}{780!}$

## סוגיה שנייה

יוסי מטיל מטבע הוגן עד הפעם הראשונה שמתקבל עץ ומסמן את כמות ההצלחות ב- $X$ . לאחר מכן מטיל יוסי  $X$  מטבעות הוגנים, כל אחד עד אשר מתקבל עץ, ומסמן ב- $Y$  את כמות ההצלחות של המטבע ה- $i$  (כאשר  $X=1,2,3,\dots,i$ ). יוסי מסמן גם  $S=Y_1+Y_2+\dots+Y_i=S$ , קלומר  $S$  הוא כמות ההצלחות הכוללת של  $X$  המטבעות.

7. מהי תוחלת  $Y$ ?

- א.  $1/4$
- ב.  $1/2$
- ג.  $1$
- ד.  $2$

8. בהינתן  $S=X$ , לאיזו משפחת התפליגיות משתיך  $S$ ?

- א. בינומית
- ב. גיאומטרית
- ג. בינומית שלילית
- ד. אף אחת מההתשובה הקודומות

9. לאיזו משפחת התפליגיות משתיך  $S$ ?

- א. בינומית
- ב. גיאומטרית
- ג. בינומית שלילית
- ד. אף אחת מההתשובה הקודומות

10. מהי תוחלת  $S$ ?

- א.  $1/2$
- ב.  $1$
- ג.  $2$
- ד.  $4$

11. מהי  $E(SX)$ ?

- א.  $3/2$
- ב.  $4$
- ג.  $8$
- ד.  $12$

12. מהי השונות של S?

- א. 10
- ב. 12
- ג. 14
- ד. 16

13. מהו ( $S, Y_1$ )<sup>coev</sup>?

- א. 2
- ב. 4
- ג. 6
- ד. 10

### סוגייה שלישית

בקריית אביב נהגים התושבים לשחק בקוביה הונגת לה חמיש פאות, הממוספרות 1,2,3,4,5. אם מטילים קובייה כזו הסיכוי לכל אחת מההתוצאות הוא 1/5.

14. משה מטיל את הקובייה (לה חמיש פאות) שוב ושוב. הסיכוי שההתוצאה 2 או 4 תתקבל לפני ההתוצאה 5 היא:

- א. 1/5
- ב. 2/5
- ג. 1/3
- ד. 2/3

משחק המזול הבא מאד מקובל בקריית אביב: מטבחצת סדרת הטלות בלתי תלויות של קובייה הונגת (בעל חמש פאות). השחקן יכול להפסיק את המשחק לאחר כל הטלה, ולקבל מספר שקלים שווה לתוצאה אותה הטלה. כך, למשל, אם תוצאה הטלה היא 5 והוא עוצר את המשחק, הוא מקבל חמישה שקלים. המשחק מסתיים ככל מקרה כאשר תוצאה הטלה היא 1, ובמקרה זה השחקן מקבל שקל אחד.

15. לאחרון משתמש באסטרטגיית המשחק הבאה: אם תוצאה הטלה היא 2 או 3—המשך לשחק. אם תוצאה הטלה היא 4 או 5—הפסיק לשחק. תוחלת הפרס של אהרון היא:

- א. 3
- ב. 10/3
- ג. 4

ד. אף תשובה אינה נכונה

16. יתרו משתמש באסטרטגיית המשחק הבאה: אם תוצאה החלטה היא 2—המשך משחק. אם תוצאה החלטה היא 3, 4 או 5—חפסק לשחק.

- א. תוחלת הפרס של אהרון שווה לתוכלת הפרס של יתרו
- ב. תוחלת הפרס של אהרון גבוהה מתוכלת הפרס של יתרו
- ג. תוחלת הפרס של אהרון נמוכה מתוכלת הפרס של יתרו
- ד. אין דינוטונים כדי לענות על השאלה

17. עבור כל החלטה על השחקן לשלם שקל אחד. תוחלת הרווח (גובה הפרס פחות התשלום עבור החלטות הקוביית) של יתרו שווה ל:

- א. 1
- ב. 2
- ג. 4/9

ד. אף תשובה אינה נכונה

18. בהתייחס לרווח (גובה הפרס פחות התשלום עבור החלטות הקוביית) של אהרון ויתרו, מה מה הבאים נכון?

- א. תוחלת הרווח של אהרון שווה לתוכלת הפרס של יתרו
- ב. תוחלת הרווח של אהרון גבוהה מתוכלת הפרס של יתרו
- ג. תוחלת הרווח של אהרון נמוכה מתוכלת הפרס של יתרו
- ד. אין דינוטונים כדי לענות על השאלה

**שאלות שאיןו חלק מסווגיה:**

נתונות שלוש הטענות הבאות לגבי זוג מאורעות A ו- B :

(i)  $P(A \cup B) = 1$  (כלומר, ההסתברות של A איחוד B היא 1).

$P(A) = P(B)$  (ii)

$\text{cov}(1_A, 1_B) \geq 0$  (iii)

19. אילו טענות מספיקות כדי להסיק ש-  $P(A) \geq 1/2$  ?

א. טענה (i) לבדה מספקת

ב. טענות (i) ו- (ii) בלבד מספיקות, אך כל אחת מהן לחוד אינה מספקת

ג. טענות (i), (ii) ו- (iii) בלבד מספיקות, אך אף שתים מהן לחוד אינם מספיקות

ד. אף תשובה אינה נכונה

20. אילו טענות מספיקות כדי להסיק ש-  $P(A) = 1$  ?

א. טענה (i) בלבד מספקת

ב. טענות (i) ו- (ii) בלבד מספיקות, אך כל אחת מהן לחוד אינה מספקת

ג. טענות (i), (ii) ו- (iii) בלבד מספיקות, אך אף שתים מהן לחוד אינם מספיקות

ד. אף תשובה אינה נכונה

## רשימת נוסחאות

Var(X)	E(X)	P(X=k)	התפלגות	
np(1-p)	np	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	Bin(n,p)	בינומית
$\lambda$	$\lambda$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	Poisson( $\lambda$ )	פיאוון
$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{1}{p}$	$p(1-p)^{k-1}$	Geom(p)	גיאומטרית
$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{1}{n}$	Unif({1,2,...,n})	אחדה על {1,2,...,n}
$n \frac{1-p}{p^2}$	$\frac{n}{p}$	$\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$	NB(n,p)	בינומית-שלילית
$n \frac{G}{N} \left(1 - \frac{G}{N}\right) \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)$	$n \frac{G}{N}$	$\frac{\binom{G}{k} \binom{N-G}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	Hg(N,G,n)	היפרגיאומטרית

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (-1 < x < 1)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$E(X) = E(E(X | Y))$$

$$Var(X) = E(Var(X | Y)) + Var(E(X | Y))$$

$$\hat{Y} = \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (X - E(X)) + E(Y)$$


$\lambda$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$e^{-\lambda}$	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407
$\lambda$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.0498	0.0183	0.0067	0.0025	0.0009	0.0003	0.0001

## STANDARD STATISTICAL TABLES

### 1. Areas under the Normal Distribution

The table gives the cumulative probability up to the standardised normal value  $z$   
i.e.

$$P[ Z < z ] = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$



$z$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5159	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7854
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8804	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9773	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9865	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9924	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9980	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
$z$	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90
P	0.9986	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000